



Ετοιμόχρηστο δόλωμα
για γρήγορη και αποτελεσματική
καταπολέμηση των κατσαρίδων



- Υψηλή αποτελεσματικότητα
- Φαινόμενο «διαδοχικής επίδρασης» για πλήρη καταπολέμηση
- Εξαιρετική δραστικότητα σε χαμηλές δόσεις

BASF
Pest Control Solutions

Λύσεις για κάθε πρόβλημα παρασίτων υγειονομικής σημασίας

 **BASF**
The Chemical Company



Το Goliath® Gel περιέχει 0,05% fipronil (φιπρονίλ), την πρώτη από μία μοναδική και υψηλής δραστικότητας ομάδα εντομοκτόνων, τις φαινυλοπυραζόλες.

Το Goliath® Gel προσφέρει μία γρήγορη και αποτελεσματική λύση καταπολέμησης των κατσαρίδων.

Το Goliath® Gel είναι ένα έτοιμο προς χρήση σκεύασμα, εφαρμόζεται εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια, καταπολεμώντας πλήρως τις κατσαρίδες και παρέχοντας ταχύτατα αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας.

Λόγω της εξαιρετικής δραστικότητας του fipronil, η διαδικασία καταπολέμησης με το Goliath® Gel απαιτεί σημαντικά λιγότερη ποσότητα δολώματος.

Υψηλή αποτελεσματικότητα

Χάρη στην υψηλή δραστικότητα του fipronil και την ελκυστικότητα του σκευάσματος σε μορφή τζελ, το Goliath® Gel δρα γρηγορότερα και εμποδίζει την επόμενη προσβολή για περισσότερο χρονικό διάστημα.

Δρα ενάντια σε όλα τα σημαντικότερα είδη κατσαρίδων, όπως:

Blatella germanica (γερμανική κατσαρίδα),
Blatta orientalis (ανατολική κατσαρίδα), και
Periplaneta americana (αμερικανική κατσαρίδα).

Κάθε μία σταγόνα (δόση) δολώματος Goliath® Gel πρέπει να έχει βάρος 0,03 γρ. και διάμετρο 3-4 χλστ.

Χάρη στην προηγμένη σύνθεση, το Goliath® Gel είναι εξαιρετικά ελκυστικό για τις κατσαρίδες που αναζητούν τροφή, ακόμη κι όταν υπάρχουν άλλες πηγές τροφής. Η λήψη τροφής ξεκινά σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή, ενώ οι κατσαρίδες πεθαίνουν μέσα σε λίγες ώρες και μετά από ένα μόνο γεύμα.





Κάθε πάτημα της σκανδάλης του πιστολιού δοσομέτρησης παράγει σταγόνα 0,03 γρ Goliath® Gel με περίπου 3-4 χλστ διάμετρο.



Φαινόμενο «διαδοχικής επίδρασης» για πλήρη καταπολέμηση

Το Goliath® Gel εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι δηλητηριασμένες κατσαρίδες επιστρέφουν στα καταφύγιά τους πρωτού πεθάνουν, όπου οι υπόλοιπες κατσαρίδες τρώνε τόσο τα περιττώματά όσο και τα πτώματά τους.

Με αυτό τον τρόπο το fipronil μεταφέρεται εύκολα από τη μια κατσαρίδα στην άλλη, ενώ η υψηλή δραστικότητά του εξασφαλίζει ότι συνεχίζει να δρα ακόμα και μετά από αρκετές μεταφορές τέτοιου είδους. Η παραπάνω διαδικασία είναι ιδιαίτερα επωφελής, μιας και επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο όλων των μελών του πληθυσμού. Έτσι αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των κατσαρίδων που εξοντώνονται με την τοποθέτηση δολώματος σε ένα μόνο σημείο.

Το φαινόμενο αυτό λέγεται «διαδοχική επίδραση» το οποίο ενισχύεται όταν η πληθυσμιακή πυκνότητα είναι υψηλή. Επίσης, διασφαλίζεται ότι το fipronil φτάνει στις νεαρές νύμφες και στις θηλυκές κατσαρίδες που φέρουν αβγά, οι οποίες σπάνια απομακρύνονται από τα καταφύγια, με αποτέλεσμα την πληρέστερη καταπολέμηση των προσβολών.

Εξαιρετική δραστικότητα σε χαμηλές δόσεις

Χάρη στην αυξημένη δραστικότητα του fipronil, η καταπολέμηση προσβολών κατσαρίδων με το Goliath® Gel απαιτεί σημαντικά λιγότερη ποσότητα δολώματος σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική μέθοδο καταπολέμησης.

Το φυσιγγιο τοποθετείται γρήγορα και εύκολα στο ειδικό πιστόλι εφαρμογής, το οποίο επιτρέπει την εύστοχη τοποθέτηση μικρών ποσοτήτων δολώματος ακόμα και στις πιο απρόσιτες τοποθεσίες, διασφαλίζοντας την ακριβή δοσολογία και μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια των εργασιών καταπολέμησης.

Τα 35 γρ. Goliath® Gel είναι αρκετά για τη δημιουργία περισσότερων από 1.100 τυπικών σημείων δολώματος των 0,03 γρ.

Συνήθεις απαιτήσεις τοποθέτησης δολώματος Goliath® Gel

Κατάσταση	Απαιτούμενα σημεία*
Οικιακή κουζίνα (~ 10 τ.μ.)	10 - 30
Οικιακό μπάνιο (~ 4 τ.μ.)	4 - 12
Άλλοι οικιακοί χώροι (~ 4 τ.μ.)	4 - 12
Κουζίνα εμπορικής χρήσης (~ 35 τ.μ.)	35 - 100
Μπαρ / εστιατόριο (~ 60 τ.μ.)	60 - 180

* Τυπική ποσότητα 0,03 γρ. ανά τ.μ. επιφάνειας, σύμφωνα με την έγκριση του προϊόντος.



Ετοιμόχρηστο δόλωμα για γρήγορη και αποτελεσματική καταπολέμηση των κατσαρίδων

Οδηγίες χρήσης του προϊόντος

Το Goliath® Gel μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των κατσαρίδων σε:

- Οικιακούς χώρους (συμπεριλαμβανομένης και της κουζίνας).
- Περιοχές χειρισμού τροφίμων (δηλ. τροφικής επεξεργασίας, αποθήκευσης και προετοιμασίας) όπως τροφοπαρασκευαστικούς χώρους, εμπορικές κουζίνες, εστιατόρια, καταστήματα τροφίμων, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης κλπ.
- Δημόσια κτίρια όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φυλακές, θέατρα.
- Εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, όπως εργοστάσια, καταστήματα, εργαστήρια, αεροπλάνα, οχήματα, τρένα και πλοία.

Συνιστώμενη δοσολογία του Goliath® Gel (Απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής ανά τετραγωνικό μέτρο*)

Είδος κατσαρίδας	Συνήθεις προσβολές	Μεγάλες προσβολές
Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>)	1	2
Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)	2	3
Αμερικανική κατσαρίδα (<i>Periplaneta Americana</i>)	2	3

* Τυπική ποσότητα 0,03 γρ. ανά τ.μ. επιφάνειας, σύμφωνα με την έγκριση του προϊόντος.

Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής και σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ακάθαρτες ή ακατάστατες ή όπου αλλού άλλα τρόφιμα δεν μπορούν να απομακρυνθούν εντελώς, χρησιμοποιείστε την μεγαλύτερη ποσότητα εφαρμογής.

Ο πιθανός αριθμός σημείων τοποθέτησης δολώματος που ενδέχεται να απαιτείται για συνήθεις προσβολές γερμανικών κατσαρίδων ποικίλει ανάλογα με το χώρο εφαρμογής.

Ο καθαρισμός των χώρων πριν από την πραγματοποίηση των εργασιών καταπολέμησης θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Goliath® Gel, καθώς θα περιοριστούν στο ελάχιστο οι υπόλοιπες εναλλακτικές πηγές τροφής.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα εντομοκτόνα κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος, καθώς αυτά μπορεί να αποτρέψουν τις κατσαρίδες από το να αναζητήσουν κανονικά τροφή.

Οι εφαρμογές του Goliath® Gel είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν το δόλωμα τοποθετείται κοντά στις εστίες κατσαρίδων και στις περιοχές αναζήτησης τροφής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή σε συνιστώμενα βασικά σημεία και πώς να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης με Goliath® Gel, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.pestcontrol.bASF.gr.



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Μην το εφαρόζετε σε ή γύρω από άγνωστους αποχέτευσης.



Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.



Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή. Οι συστάσεις όσον αφορά στη χρήση, που παρέχονται μαζί με κάθε προϊόν, πρέπει να προσύνται με προσοχή.

Το Goliath® Gel είναι σήμα κατατεθέν της BASF.
Το Goliath® Gel περιέχει fipronil.

Για περισσότερες πληροφορίες:

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200, e-mail: pestcontrol-bASF@basf.com
www.pestcontrol.bASF.gr