

Fourmidor®

Ετοιμόχρηστο δόλωμα
για γρήγορη και αποτελεσματική
καταπολέμηση των μυρμηγκιών



- Υψηλή αποτελεσματικότητα
- Ακαταμάχητη ελκυστικότητα
- Γρήγορος και πλήρης έλεγχος της αποικίας

BASF
Pest Control Solutions

Λύσεις για κάθε πρόβλημα παρασίτων υγειονομικής σημασίας

 **BASF**
The Chemical Company

Fourmidor®

Το **Fourmidor®** είναι εντομοκτόνο δόλωμα για ολοκληρωμένο και αξιόπιστο έλεγχο των μυρμηγκιών.

Το **Fourmidor®** είναι ένα έτοιμο προς χρήση σκεύασμα, με δραστική ουσία fipronil.

Το **Fourmidor®** εκμεταλλεύεται τη φυσική διατροφική συμπεριφορά των μυρμηγκιών για να εξασφαλιστεί ο γρήγορος και πλήρης έλεγχος της αποικίας.

Το **Fourmidor®** εφαρμόζεται εύκολα, γρήγορα και με ακρίβεια για μία αποτελεσματική και υπεύθυνη εφαρμογή.

Υψηλή αποτελεσματικότητα

Το **Fourmidor®** περιέχει 0,05% β/β fipronil, την πρώτη από μία μοναδική και υψηλής δραστικότητας ομάδα εντομοκτόνων, τις φαινυλοπυραζόλες που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων.

Το fipronil είναι ένα ισχυρό εντομοκτόνο που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων με τέτοιο τρόπο που το καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο σε στρατηγικές που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα.

Χάρη στην υψηλή δραστικότητα του fipronil σε χαμηλές δόσεις και στην ελκυστικότητα του σκευάσματος σε μορφή τζελ, το **Fourmidor®** δρα γρηγορότερα και είναι το κορυφαίο δόλωμα σε μορφή τζελ.

Ακαταμάχητη ελκυστικότητα

Το **Fourmidor®** είναι αποτελεσματικό για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών (οικ. Formicidae), όπως των μαύρων μυρμηγκιών των κήπων (*Lasius niger*) και των Αργεντίνικων μυρμηγκιών (*Linepithema humile*) εντός και εκτός κατοικιών και άλλων κτιρίων.

Το **Fourmidor®** είναι ένα δόλωμα, σε μορφή gel, με βάση τους υδατάνθρακες. Οι έρευνες και η σε βάθος κατανόησης των διατροφικών συνηθειών των μυρμηγκιών επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη απήχηση των υγρών δολωμάτων σε σύγκριση με τα πιο στερεά δολώματα.

Γρήγορος και πλήρης έλεγχος της αποικίας

Η ακαταμάχητη ελκυστικότητα του δολώματος στα μυρμήγκια σε συνδυασμό με την προηγμένη μη απωθητική (μη ανιχνεύσιμη) τεχνολογία του fipronil, προκαλεί την άμεση κατανάλωση του δολώματος.

Λόγω της βραδείας δράσης του fipronil, το **Fourmidor®** μεταφέρεται πίσω στην αποικία και μέσω της διαδικασίας της τροφάλλαξης μεταφέρεται και στα υπόλοιπα μυρμήγκια.

Το μοναδικό αυτό φαινόμενο της «διαδοχικής επίδρασης» ("Transfer Effect™"), καθιστά το **Fourmidor®** εξαιρετικά δραστικό κατά των μυρμηγκιών.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο θάνατος επέρχεται μετά από 12 – 24 ώρες από την κατανάλωση του **Fourmidor®**. Κατ' επέκταση, ενήλικα, προνύμφες και βασίλισσες πεθαίνουν καταναλώνοντας ακόμα και μικρότερη από την αρχική δόση, οδηγώντας στην κατάρρευση της αποικίας μέσα στις επόμενες 10 – 14 ημέρες.

Πηγή: Biogenius, 2009

Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις	Χρόνος Εφαρμογής
Εντός και εκτός κατοικιών και άλλων κτηρίων	Μυρμήγκια	1 σταγόνα 3 – 4 χιλ. (περίπου 0,03γρ.) ανά 30 εκ., επάνω στις γραμμές που κινούνται τα μυρμήγκια.	Από τη στιγμή της εμφάνισής τους

Fourmidor®

Ετοιμόχρηστο δόλωμα για γρήγορη και αποτελεσματική καταπολέμηση των μυρμηγκιών

Οδηγίες χρήσης του προϊόντος

Το **Fourmidor®** είναι ένα έτοιμο προς χρήση σκεύασμα, δρα δια επαφής και μέσω κατάποσης.

Εφαρμόστε 1 σταγόνα 3 - 4 mm (περίπου 0,03 γρ.) ανά 30 εκ. πάνω στις γραμμές στις οποίες κινούνται τα μυρμηγκία, εντός και εκτός κτιρίων.

Οι επιφάνειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή να ελέγχονται μετά από 1 με 2 εβδομάδες ή και νωρίτερα. Εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί πλήρως και υπάρχει ακόμη δραστηριότητα των μυρμηγκιών στην περιοχή, θα πρέπει να γίνεται επανάληψη της εφαρμογής.

Χρήση εκτός κτιρίων: Οι φωλιές των μαύρων μυρμηγκιών στον κήπο συχνά βρίσκονται κάτω από μονοπάτια, πλάκες ή τοίχους, που παρέχουν ειδική προστασία για την αποικία.


Τα κίτρινα μυρμηγκία πάντα ζουν έξω και κινούνται κατά μήκος ρωγμών στους τοίχους και στα μονοπάτια της αυλής για να είναι προστατευμένα.

Το **Fourmidor®** είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν εφαρμόζεται στη γραμμή/μονοπάτι που ακολουθούν τα μυρμηγκία.

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν ή καθαρίζονται συχνά.

Μην ψεκάζετε κανένα άλλο εντομοκτόνο στα σημεία που εφαρμόζεται το **Fourmidor®** και μην το εφαρμόζετε εάν ήδη έχουν ψεκάσει με άλλα εντομοκτόνα πρόσφατα, γιατί μπορεί να επηρεάσει την ελκυστικότητα του δολώματος.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος, η περιοχή στην οποία κινούνται τα μυρμηγκία θα πρέπει να καθαρίζεται από οποιαδήποτε εναλλακτική τροφή, πριν την εφαρμογή του.



Επιβαλές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.



Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται ως συμβουλή.

Οι συστάσεις όσον αφορά τη χρήση που εκδίδονται για κάθε προϊόν πρέπει να τηρούνται με προσοχή.

Το Fourmidor® είναι σήμα κατατεθέν της BASF.
Το Fourmidor® περιέχει fipronil.

Για περισσότερες πληροφορίες:

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή

Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100 Fax: 210 68.60.217 e-mail: pestcontrol-basf-GR@basf.com

www.pestcontrol.basf.gr

 **BASF**
The Chemical Company