

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Πριν από την εφαρμογή πρέπει να γίνεται πάντα καθαρισμός όλου του χώρου. Κάντε όλα τα υπάρχοντα άχρηστα υλικά. Εφόσον χρησιμοποιείται εντομοκτόνο προοριζόμενο για την ίδια χρήση μέσω ψεκασμού, ο ψεκασμός όλων των επιφανειών και του περιεχόμενου εξοπλισμού θα πρέπει να προηγείται της εφαρμογής του καπνογόνου. Εκκενώστε το χώρο από ανθρώπους και ζώα, κλείστε τις διόδους αερισμού, παράθυρα και πόρτες (εκτός από την πόρτα εξόδου) πριν την εφαρμογή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες διαρροής. Αν απαιτούνται παραπάνω από ένα καπνογόνα, καταλείμετέ τα ομοιόμορφα στο δάπεδο πριν τα ανάψετε. Ανακινήστε καλά τα καπνογόνα πριν τα ανοίξετε. Απομακρύνετε το κάλυμμα και ανάψτε την προεξέχουσα άκρη του φυτιλιού. Μην τραβήξετε το φυτίλι ανάφλεξης. Το φυτίλι θα σιγοκαίει και η ανάφλεξη του καπνογόνου θα γίνει μετά από 20 δευτερόλεπτα. Μόλις ανάψετε το φυτίλι, πρέπει να εγκαταλείψετε αμέσως το χώρο. Η αποθήκη να μένει κλειστή για 24 ώρες και να αναρτώνται πινακίδες προφύλαξης. Μετά το πέρας του καπνισμού αερίστε καλά το χώρο για 1 ώρα, πριν μπείτε για να εργαστείτε στην αποθήκη. Να μην εισέρχεστε στο χώρο για τουλάχιστον 4 ώρες μετά την εφαρμογή εκτός αν φοράτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Οι κονσέρβες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:

Προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (μάσκα EN 136 με φίλτρο EN 143 P3).

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Άδειος αποθηκευτικός χώρος προοριζόμενος για αποθήκευση σιτηρών.

ΣΤΟΧΟΣ: Έντομα και ακάρεα αποθηκών π.χ.: Κόκκινο σκαθάρι των αλεύρων, Πριονοτό σκαθάρι των δημητριακών, Εφέστια, Άκαρι των αλεύρων.

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 1 καπνογόνο των 90 γραμ. ανά 570 κυβικά μέτρα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Η απεντόμωση πρέπει να γίνεται αργά την Άνοιξη ή νωρίς το Καλοκαίρι. Σε περίπτωση σοβαρών προσβολών η εφαρμογή επαναλαμβάνεται μετά από 6 εβδομάδες.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΔΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: 2.
Παρατηρήσεις: 1) Για καλύτερα αποτελέσματα απαιτείται ελάχιστη θερμοκρασία 20 °C.

2) Η εφαρμογή του πρέπει να συνδυάζεται μετά την εφαρμογή εντομοκτόνων που προορίζονται για την ίδια χρήση μέσω ψεκασμού διότι προκαλεί την κίνηση των εντόμων και ακάρεων από δυσπρόσιτες περιοχές του αποθηκευτικού χώρου σε περιοχές όπου έχει ψεκαστεί το κατάλληλο εντομοκτόνο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Τουλάχιστον 4 ώρες.

FUMITE

PIRIMIPHOS METHYL (ΠΙΡΙΜΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ) 22,5% ΚΑΠΝΟΓΟΝΟ (FU)

Εγγυημένη σύνθεση:

Pirimiphos-methyl: 22,5% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 74,4% β/β

ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΟΗΣ.

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ ΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΛΑΕΙΟΥΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ, ΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΑΚΑΡΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

•Εύφλεκτο στερεό. •Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. •Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. •Πολύ τοξικό για τους υδρόφιτους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. •Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. •Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Πλύνετε τα χέρια και τα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/ εκνεφώματα. •Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. •Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένου τόπου απομάκρυνσης χημικών απόβλητων/ συσκευασιών. •Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Αριθ. άδειας διάθεσης στην αγορά (ΥΑΑΤ): 14.614 / 16-6-2017

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια του αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία τε καλά αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ: Σε ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε α συμβουλή. Αφαρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα ξαναχρησιμοποιήστε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛ γιαντρώ, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Αφο ρούχα και πλύνετε καλά τα εκτεθειμένα μέρη του σ σαπούλι. Συμβουλευτείτε γιατρώ σε περίπτωση ποι

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλ κρατώντας τα βλέφαρα χωριστά και αφού απομακρ επαφής, με καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά

οφθαλμίατρώ σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμέ **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** ΜΗΝ προκαλέσ αμέσως τον ασθενή και τη συσκευασία του προϊόν νοσοκομείο και ζητήστε ιατρική συμβουλή και αγε

Αντίδοτο: Θεϊκή Ατροπίνη, pralidoxim, με τις οδη **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:** 210 77937

Ημερ. Παρασκευής (Prod. Date) : Αριθ. Παρτιδ