

ΔΟΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είδος στόχου	Πεδίο εφαρμογής	Δοσολογία
Mus musculus (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά & Ενήλικα	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι γύρω από τα κτήρια	Έως 40γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις δημητρίου τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε 2η
Rattus norvegicus (Καφέ Αρουραίο) Νεαρά & Ενήλικα	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι γύρω από τα κτήρια	Έως 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε αποστάσεις 10η μεταξύ τους, σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής μειώστε την απόσταση σε δημ.
	Υπόνομοι (Μόνο για επαγγελματική χρήση)	Έως 200γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.

ΔΩΣΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση των δόλωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω απόκτηρια και σε υπαύγοντα.

• Τοποθετήστε το δόλωμα όπου υπάρχουν ενδείξεις δραστηριότητας τρωκτικών, όπως φρέσκα περιπτώματα, μεριά ή κοντά σε φωλιές και λαγόγυρα, διάρροιές και χώρους άστισης τρωκτικών. Τα δόλωμάτα τοποθετούνται εγγύς δολωμάτων σταθμών (σταθμοί ασφαλείας) που είναι στερεωμένοι στο σάρωμα ή σε προστατισμένη δημιουργία δόλωμάτων.

• Κάντε συγκές επιθεωρήσεις στα σημεία δόλωσης κατά τις πρώτες 10-14 μέρες και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα όπου φαγώθηκε από τρωκτικά ή οποιοδήποτε άλλο θέμα.

• Εγγύεστε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πουλιά και ζώα που δεν αποτελούν στόχο (κυρίως σκύλους, γατές, χίρους και ποιλερικά). Όπου είναι δυνατό, ασφαλάτστε τα δόλωμάτα είτε ώστε να μην υπάρχουν να παραμέρουν. Οι κύριες των δόλωμάτων είναι η ασφαλίστωση με άμμο ή να καρφώνονται στη θέση τους.

Αν όλο το δόλωμα έχει φαγώθηκε σε ορισμένες περιοχές, αξέρτε την ποσότητα του δόλωμάτου, τοποθετήστε περισσότερες θέσεις δόλωμάτων. Μην αξέρετε την ποσότητα του δόλωμάτου. Είναι γενικά πολύ πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο αριθμό σημείων δόλωμάτων σε σύγκριτη με μικρότερο αριθμό και με μεγαλύτερη ποσότητα δόλωμάτων.

Μεγάλες ποσοτήτες δόλωμάτων αυξάνουν τον κίνδυνο για την αγρυπνία και τα άλλα ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφημοργής του προγράμματος, τουλάχιστον 100 συγκρ. στις οποίες τα δόλωμάτα ελέγχονται και ανατρέπονται. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις μπορεύουν να αποτελέσουν καρκινογόνες στην επιδερμίδα. Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά αυτούντως με τις τοπικές απατήσεις.

ΧΡΗΣΗ ΣΑ ΗΔΙΟΣΙΟΝ ΧΡΟΥΣ

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόποιο χώρους, οι περιοχές φραγμώνται θα πρέπει να επισημανούνται για όλη την περιοχή εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μηκούς των περιοχών τοποθετήστε των δόλωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενών και δευτερογενών δηλητηριάσεων από αντιπτικό τρωκτικότονο στούς επιλογής και οι πρωτες βοηθείες σε περιπτωτική δηλητηρίαση. Όταν χρησιμοποιούνται δολωμάτικοι σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκράτεια επι της συσκευασίας τους ότι περιεχουν τρωκτικότανά και να μην παραβάζονται.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο σε συνεργεία μακτονίας που έχουν άδεια από το ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΚΕΣ ΑΠΟΗΙΚΕΥΣΗΣ

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια, στην ορχική, κλειστή συσκευασία του, σε κήρα και δρόσεως μέρος, προστατευμένο από το φως, μακριά από παίδια και κατοικίδια ζώα.

GHS08 ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

H360D: Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

H372: Προκαλεί βλάβη στα οργάνα - αίμα, μέσω παρατεταμένης ή επαναλαμβανόμενης έκθεσης

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίτραση

ΥΠΟ: 9Y10-HOJD-Q001-MDXX

WAX BLOCK BAIT

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ.Α.Α.&Τ.: ΤΠ14-0106

Εγγυημένη Σύνθεση:

Bromadiolone (Βρομαδιολόνη) 0,005% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

Περιέχει τον πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate - Χρώμα κόκκινο

Κάτοχος της Έγκρισης:

PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο
Παρασκευαστής του σκευασμάτος: PELGAR International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο



International



- ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

5kg 10kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

10gr 20gr
ΒΑΡΟΣ ΚΥΒΟΥ



Υπεύθυνος επικοινωνίας,

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση :

ΓΟΥΛΑΣ PROTECTION A.E.

Ζαρειστούλου 9-11, 11145, Αθήνα

Τηλ. 210-83.11.100, 210-83.11.107 FAX: 210-83.11.104

www.gprotection.gr - e-mail: info@gprotection.gr



ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

P200 Να φοράτε προστατευτικά γάντια

P201 Εφοδιαστείτε με πις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202 Μην τη χρησιμοποιούστε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΒΕΣΗΣ ή πθωμής: Συμβουλεύετε/ Εποικεφθείτε γιατρό.

P314 Συμβουλεύετε/ Εποικεφθείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

P404 Φυλάσσεται σε κλειστό περίεκτη.

P501 Διάθεση του περίεκτη σε συμφωνία με τους τοπικούς κανονισμούς.

EUN 208 περιέχει 1, 2-Βενζισοθιαζολ-3-ονε. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUN 208 Περιέχει 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

• Διατρέψτε / Αποθηκεύτε μακριά από πρώτα, μάλιστα και ζωτηροφέρες.

• Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλά (αγρυπνία) ή μη.

• Πλύνετε τη χέρια και τα ακαλπάτα μέρη του σκέυασμάτος πριν φάτε πιετέ ή καπνίσετε και μετά την εφαρμογή.

• Όταν τα δόλωμάτα της χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δόλωμάτα θα πρέπει να επισημανούνται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δόλωμάτα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρώτογενων και δευτερογενών δηλητηριάσεων από αντιπτικό τρωκτικότονο εντός μεταξύ των περιοχών τοποθέτησης δόλωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοηθείες σε περίπτωση δόλητηρισης.

“Γιαφί ων αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπην υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• Συμβουλεύετε/Εποικεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Πρώτες βοηθείες: Η βρομαδολόνη (bromadiolone) αποτελεί ένα αντιπτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία μπορεί να καθυτερίσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να κατεμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίσης (INR) στην εμφάνιση του περιπτωτικού ακύρου και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίσης είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 μγ βιταμίνη K1 (με βιταμίνη K1 (φωτομεναδόλη) μέσω αργής ενδόφλεβιας έγχυσης (100 μγ/κg ιωματικού βάρους για παιδιά). Ενδέχομενος να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από την οποία η ενδόφλεβης) για αρκετές εβδομάδες.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε τα μάτια γιαρά και απαλά με νερό για 15 λεπτά και συνεχάζετε να ξεπλύνετε τα μάτια. Παρακαλούσθετε την ασθένη για συμπτώματα δηλητηρίασης (μυορραγίας, αίμα στα ούρα, αιμόπτωση, έσφικτος και σαυνήθμοτος πόνος στην κοιλαίνη χώρα, αίμα στα ούρα, αιμόξηρον κρύσταλλος του αιματού).

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαρείστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακαλούσθετε την ασθένη για συμπτώματα δηλητηρίασης όμως με τα παραπάνω.

Σε περίπτωση κατόπιν, ξεπλύνετε το στόμα σε άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβούλη δενγονώντας την εικαστική. Μην προκαλέσετε εμέτο εκτός και σαν συμβουλεύετε σχετικά με αιτιολόγη το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χρησιμεύετε τίτανο από το στόμα σε άποια που έχουν χάσει τα αισθήσεις τους. Η χρήση του να γίνεται με ιδιαιτερή προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπτική αγωγή.

Αντιδότο: Βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση)

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

Αναζητήστε τα νέκρους αρμοριόδια που ποντίκια και θάμψτε τα ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Τα αντιπτικά τρωκτικότονα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μονυμά δολώματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας δε δε θα πρέπει να επανορθωθούνται σε σημεία συλλογής για ανάκυρη υγείαντας ή ανάκυρη ενέργειας.